

boso). Japan:—Kiushu: Prov. Osumi: Miyanoura (Yakushima) (Oct. 13, 1949, S. Katsuki); Formosa:—Prov. Taihoku: Shikikun (July 26, 1934, Y. Hashioka); Rumoan (July 30, 1934, Y. Hashioka).

The present species is new to Japan and Formosa.

25. **Puccinia Polygoni-amphibii** Persoon, Syn. Meth. Fung. 227 (1801).

Hab. II, (III). On *Fagopyrum vulgare* Hill var. *autumnale* Nemoto (*F. esculentum* var. *autumnale* Mak.) (Soba) (cult.). Japan:—Kiushu: Prov. Hiuga: Miyazaki-shi (Oct. 23, 1936, S. Hirata). *Fagopyrum vulgare* var. *autumnale* is a new host plant for this fungus.

26. **Uredo Laportae** Hiratsuka f., nov. spec.

Soris hypophyllis, laxe aggregatis vel sparsis, rotundatis vel ellipsoideis, minutissimis, 0.08~0.2 mm diam., mox nudis, pallide brunneis; paraphysibus numerosis, capitatis vel clavato-capitatis, saepe curvatis vel irregularibus, dilute flavo-brunneis, 32~60 μ longis ad apicem 12~25 μ latis et membrana incrassata (3~5 μ) praeditis cinctis; sporis subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, densiuscule echinulatis, pallide flavo-brunneolis, 24~33 \times 15~25 μ ; episporio 1~1.5 μ crasso.

Hab. II. On *Laportea bulbifera* Wedd. (*Mukago-irakusa*). Japan:—Honshu: Prov. Echizen: Eiheiiji (Sept. 24, 1939, Hiratsuka, f. & E. Tobinaga, *type!*), Prov. Inaba: Mt. Hyonosen (Aug. 29, 1930, Hiratsuka, f.).

This fungus seems to be a species of *Phakopsora*, but it is proposed to classify it provisionally under the above name until its teleutospores are found.

○東亞植物圖説の最新號 Latest issue of Dr. Nakai's Iconographia Pl. Asiae Orient. by Shunyōdo Shoten, Tokyo.

Vol. 5 No. 2 (March, 1952) が出た。第148~155 圖版でヒトヨシテンナンショウ、シホカゼザクラ、オホアヲカモメヅル、ウナヅキギボウシ、オホクルマバツクバネ等を圖解。近頃の代表的な植物畫家、加納川、安達、二口、太田の諸氏が筆を競っている。英國の畫家 Blunt 氏が The Art of Botanical Illustration (1950) という植物の畫の變遷史を書いた中に、近代の日本での植物畫の代表として本書を擧げていること、思い合せると興味がある。東京春陽堂の發行、定價 250 円 (前川文夫)